

Mémoire Sur les tumeurs du Scrotum et de la verge

M. Louis

Par M. Bourvian, Correspondant



ARC 22d. 1 n° 14

51
Mémoire sur les Tumeurs du Scrotum
ou des testicules.

Le Scrotum et les testicules sont exposés à un grand nombre de maladies, dont on trouve le détail dans les Auteurs; les Anciens ont rangé les tumeurs de cet partie sous différentes espèces, et les Modernes en ont assigné plus positivement le Siège et l'essence. Mais il n'est qu'on n'aura pu spécifier, parce qu'elles ne dépendent pas proprement de la lésion de ces organes, et qu'elles ne se rencontrent pas dans la pratique ordinaire. On en verra un exemple dans la tumeur du Scrotum dont j'ai parlé, et dont les praticiens des plus consommés auroient été peut-être aussi embarrassés que moi, à en déterminer l'essence et le caractère.

1^{re} observat.

Un mois de Septembre 1760. Je vins à l'hôpital de Cassin un Soldat Suisse, attaqué d'une tumeur très considérable dans toute l'étendue du Scrotum du côté gauche: Le malade n'éprouvoit point de douleur, et n'en avoit aperçue qu'au commencement où il s'apperçut de la tumeur. C'étoit en 1749. La tumeur commença au dessous de l'anneau, fit des progrès fort lents; peu inquiète sur les suites je fus long-temps sans demander conseil au chirurgien du Régiment, quatre ans après je le consultai; La tumeur à lors étoit devenue grosse comme un œuf de poule, plus longue que grosse, peu douloureuse, et accompagnée d'un gonflement passager. On lui consulta de faire usage des Cataplasmes émollients, ce qui fut fait pendant Long-temps, La tumeur

diminua point, mais elle n'a d'augmenter & resta
dans le même état, après, jusqu'à Campagna d'Alle-
magne. Malgré l'opération que le malade avoit eue
sur l'urètre, la fatigue ou la morne & le plus grand gonflement,
sans augmenter les douleurs, il porta cette tumeur jusqu'à
toute l'extrémité de l'urètre. Il entra à l'hôpital, la tumeur
étoit pour l'ora grosse comme une petite orange, le gonflement
s'étendoit depuis l'anneau jusqu'au bas du Scrotum, & le
tout étoit mou & pâteux, je sentois de tendue & de l'ordon
des vaisseaux qui me paroissent être presque dans l'état
naturel. Le malade étoit sans fièvre & portoit bien d'ailleurs.
Le lendemain de son arrivée je le questionnai pour m'instruire
de la cause du mal, il me dit qu'il n'avoit jamais eu aucun
coup dans cette partie, ni au qu'une maladie vénérienne,
que ce qu'il présumoit avoir donné naissance à la tumeur, étoit
un effort violent qu'il avoit fait en levant une pierre au poids,
que dans l'instant même il sentit un craquement dans
l'aine, & une douleur assez vite dans la même partie; que
cela étoit passé au moyen d'une saignée, & de quelques com-
presses trempées dans l'eau chaude, que depuis & autre, il
n'avoit éprouvé d'ailleurs douleurs, qu'il étoit apparu d'une
petite tumeur qui a parcouru les gradations d'augmentation
dont j'ai parlé plus haut. Je purgeai le malade & le mis
à l'usage de quelques Bols fondans, j'appliquai sur la tumeur
des cataplasmes émollients actifs pendant cinq jours, le
malade ne voulut point se soumettre à aucun régime; ne
voyant aucun changement à la tumeur, point de douleurs,
toujours mou & pâteux, comme s'il y avoit eu quel que
humour épais & épanché. Plusieurs Chirurgiens examinèrent



Latamur, et furent très induits sur son Caractère. —
J'y proposai d'insérer l'ouverture, les crâtes furent partagées
sur le moyen, les uns voulaient des Caustiques, et le D^r
autres L'Instrument tranchant, j'eus intérêt des derniers;
Le malade déterminé, je le mis dans une position favorable;
j'eus une incision qui pénétra jusqu'au dessous du tégument,
et la prolongeai jusqu'au bas du Scrotum; étant parvenu
au lieu où je soupçonnais l'ouverture épanchée, j'en trouvai
peu, j'eus surprise de voir le Scrotum rempli d'une
Substance approchant de l'alouche de foie pourri, n'ayant
que très peu d'odeur, j'en tirai par toutes les bords un
gâteau fuité, cette Substance ou matière n'étoit point
liquide; J'introduisis Mondoigt du Pôlé un nouveau
où j'en tirai une certaine quantité, le tout pourroit remplir
les deux mains, et fut mis dans un sac ou kiste en
épais que j'en portai en partie. Le cordon des Vaisseaux
Spermatiques et le testicule étoient purs et dans l'état naturel.
Comme il n'y avoit point de Suppuration, que les parties
étoient peu douloureuses, j'eus l'usage de la saignée avec un liget
un peu serré, et mis des Compresse trempées dans l'eau
de chaux animée avec l'eau Vulvaire, le tout fut recouvert
d'un bandage méthodique. Je soumis le malade au
régime, les premiers jours il ne sentit aucun mal, la
Suppuration commençoit à s'établir et étoit d'une
couleur jaunâtre; Le huitième jour le malade éprouva
quelques douleurs de ventre, j'en pris plusieurs Lavemens,
et les fomentations émollientes furent mises en usage. Le
dixième jour la fièvre depuis elle devint assez considérable,
Le malade fut saigné deux fois. Malgré les précautions
prises en pareil cas, un Cour de ventre se déclara et dégénéra
en dysenterie, le malade tomba dans le Marasme et

pu s'écarter, la suppuration fut entièrement supprimée. Je mourus le vingt-neuf jours après l'opération.

Curios de l'homme La cause, ou les disorders survenus à la suite de la maladie, je fis l'ouverture du corps et commençai à disputer au dessus de l'anus du même côté, je continuai l'incision jusqu'à l'endroit où se trouve le fordon spermatique pour passer sous le petit oblique; j'examinai avec attention les intestins et suis le lumen dans ses dernières circonvolutions; j'enlevai une portion du second et du troisième intestin épiplé dans l'anus du même côté de la maladie, je gagnai une portion assez brève de l'intestin, je fis sur elle une incision perçue à l'endroit en question dans l'anus, l'incision de l'intestin avait quatre lignes de diamètre et étoit ovale; le reste du canal intestinal étoit dans l'état naturel. D'après ce que j'en disais, il y a lieu de croire que dans l'effort que j'en fis de malade, une portion de l'intestin étoit brossée par l'anus dans l'anus, et formait une bourse de l'intestin sous le nom de ^{littre} ~~littre~~. Mais les douleurs vives qu'il éprouve ordinairement dans une circonstance, auraient dû déterminer le malade à demander du secours; il y a apparence qu'il y a eu une inflammation assez forte, pour faire tomber en gangrène cette portion d'intestin. Mais dans quel temps aurait-elle été tombée en gangrène, et quand l'intestin aurait-il été percé? Le tout n'est pas facile à décider, je n'est pas probable que ce soit dans les premiers jours de la maladie: celui étoit enflammé et dans le fide étoit une matière fécale? Commencez-vous à dire qu'elle a pu être aussi longtemps sans occasionner d'accidents? Je laisse le point à discuter à l'Académie. On ne sera pas surpris que le malade alloit à la selle comme à l'ordinaire, puisqu'il n'y avoit qu'une portion du second intestin épiplé. Si la maladie avoit été connue dans les premiers temps, on auroit pu tenter l'opération qu'on fait dans les hernies contre le trou de l'anus de l'intestin. C'est par la première fois que j'ai vu un intestin percé, le malade n'ayant presque pas éprouvé de douleurs.



2.^e observat.

Un Soldat du régiment de dragons Dupin, fut transféré de Zelle sur l'hôpital d'hanovre, au mois d'octobre 1767. Il a vait eu la fièvre et un ulcère au bras considérable. M. de Vaisper chirurgien major de l'hôpital militaire de Beyanow, à l'ouydenmajor de l'armée, le traita de sa maladie dans l'ambulance. Il se plaignit d'avoir une tumeur, qu'il portoit au bras, au dessus de l'articulation de l'humérus et interne de la faine aqueuse travers de doigt de l'humérus. La tumeur étoit du volume d'un gros œuf, pale et peu douloureuse, on y sentoit un fluide épais épais. L'ouverture de la tumeur déterminée M. de Vaisper nous appela M. Lambel et moi, nous trouvâmes qu'il falloir ouvrir la tumeur. L'ouverture faite Il n'en sortit que des matières fécales et des liquides, de doigt introduit dans la tumeur et un style dans l'ouverture de la tumeur, nous reconnûmes que l'intestin étoit percé à deux travers de doigt au dessous du pectus cutané. Le malade fut pansé avec un cataplasme, et par dessus un bandage compressible, le lendemain il ne parut point d'écoulement ni les jours suivants, on employa des injections d'essence de badier et d'essence d'ail, l'ulcère se detergea, les chairs se réunirent et chaque jour l'ouverture de la tumeur, celle de l'intestin se trouva fermée. Dans le cours de la guérison on n'apprit apparemment que des matières fécales. Le malade en sortit guéri six semaines après l'opération, supportant bien et ne montrant aucune douleur; Je craignois que la perforation de l'intestin ne fut pas cicatrisée solidement, et qu'il ne survint par la suite des tumeurs qui qu'abîmât fistuleux. J'ai eu occasion de voir le Soldat trois ans après j'étois à Vintz, il étoit encore solidement guéri.

3.^e observat.

Un mois d'août 1767 le nommé Kaffner, Soldat

au régime d'été, entra à l'hôpital de Bartio
Septuaginta d'avoit une tumeur au testicule droit depuis
plusieurs années. Il étoit entré à l'hôpital de Calvi au
mois de janvier de la même année, où il fut traité en la
même maladie pendant deux mois, sans succès au un
soulagement. Il m'écrivit au vu d'un chirurgien; ne pouvant faire
son service il fut en voyé à Barma au tant de monsieur Guesph.
Il fut examiné des tumeurs selon son avis par le chirurgien
ajdant-major chargé du service à la salle où il étoit. Le troisième
jour le chirurgien m'en rendit compte, il me dit que le Soldat
avoit un Sarcome; J'étais le quatrième jour et l'examinai
ex situ. Le Soldat étoit maigre, extenué, ayant en grande
quantité une tumeur considérable. Le Scrotum au côté
droit étoit en la grosseur d'un petit melon, Latamius étoit allongé
et s'étendoit jusqu'à l'anus, ^{il étoit} d'une forme une pierre et au
côté son étendue, par douloureuse, le malade n'en éprouvoit
rien quand il étoit debout, et apaisoit un tiraillement qui reprenoit
jusqu'à dans le bas-ventre. Je touchai Latamius sans pouvoir
distinguer le testicule, la gauche étoit dans son état naturel.
Cela partie supérieure près de l'anus. Je sentis le forceau
spermaticque qui étoit très gonflé. Je questionnai le Soldat
pour tâcher de découvrir la cause de la maladie. Il me dit qu'il
n'avoit fait aucune chute ni rien au cours d'un coup sur cette
partie, qu'il y avoit sept ans que Latamius avoit commencé,
que dans le principe elle n'étoit pas plus grosse qu'une noix et
lui occasionnoit des douleurs considérables. Il me parut
être embarrassé de la maladie qu'il y avoit quel que chose
de caché dans son fait, il avoit eu l'apine d'aprouver à mes
questions, surtout quand j'eus demandé s'il n'avoit pas
eu de chaudes pisse. Il m'avoua qu'il en avoit eu une
il y avoit sept ans et demi, qu'un de ses camarades l'avoit
traité, et lui avoit fait prendre des remèdes sous les effets



Augmentum des douleurs, quel que jour après l'écoulement
disparut. Le testicule droit gonflé et douloureux; Je fus
obligé d'entrer à l'hôpital de Montpellier, où il fut saigné
plusieurs fois, mis à l'usage d'une Serru, et les cataplasmes
cousuables à son état furent appliqués sur la tumeur.
Les premiers succès passés, Comme il restoit des douleurs
dans les testicules on jugea à propos en lui faire prendre
Sept fois dragées antiscorbutiques de Kessler. Malgré les
effets du remède, le testicule se gonfla et les vaisseaux
Spermatiques restèrent d'un volume considérable, quel que
légers frictions les diminuerent un peu, et comme le malade
ne souffroit plus il sortit de l'hôpital. Mais quel que
mois après il reprit des douleurs au testicule et au fordon,
il ne pouvoit pour entrer à l'hôpital, cependant le
gonflement du testicule si considérable, qu'il fut obligé de
le rendre et je le ferois dans l'état dont j'ai fait
mention Cydessus. Je crus qu'un peu d'émulsion
étoit la cause première du mal, en conséquence je fus
obligé, par la purgation et les bains, à rendre les
frictions pendant la purgation. Je fis appliquer
sur le testicule des cataplasmes emollients et résolutifs.
L'usage de huit jours des cataplasmes rapportèrent au malade
changement à la tumeur, toujours de la même grosseur
dure et peu douloureuse, je les continuai jusqu'au quinzième
jour, mais sans effet apparent. indépendamment des
frictions que le malade rendoit sur les différentes parties
du corps, je lui fis faire des frictions sur le fordon
d'un. Le vingt quatrième jour d' traitement, je lui appliquai
d'un peu de Moline à la base de la tumeur. Je redoublai
d'attention pour savoir s'il n'y avoit pas de fluides
épanchés. Tous les moyens indiqués en pareil cas
se me firent venir à l'esprit. j'appellai en consultation

Plusieurs Chirurgiens, la Magnitude que C'étoit
Un Sarcome, les autres uterum sans porter aucun jugement
Sur la nature de la tumeur. J'eus exposé le Doubton que
j'avois d'un liquid. épais, les avis furent partagés. —
Persuadé que j'avois l'un de la fluctuation je me décidai adonner
Un coup de trois ou à la parie d'après de l'écou de la tumeur, je
le plongeai en précaution, en pointant Sur la tumeur je sentis
beaucoup de résistance, et dans l'instant j'eus dans la main
où pouvois mieux dire dans l'organe où il y avoit du liquid,
Je sortis, après pris, quinze onces d'une eau jaunâtre et foetide.
La tumeur s'affaissa presque entièrement, et tomba à l'ord.
de l'estime d'un vint-huitième gonfle le dos, le ppididyme étoit
d'un Volume Considérable, ainsi que le lardon des vaisseaux
Spermatiques Surqu'à l'ancien. J'eus fait la tumeur à fin de faire
Des injections avec du vin de baume de storax; Le malade
fut après bien qu'on quarante huit heures, et tout à coup
Il fut attaqué d'une douleur des plus vives, aux environs de
l'endroit où j'avois fait l'opération, le testicule et le Scrotum
devinrent aussi gros qu'un paravant durs et enflammés,
Une saignée et les cataplasmes Anodins calmèrent les douleurs,
Le gonflement subsistoit toujours; Le sixième jour après
l'opération, je sentis de la fluctuation au dessous de l'epididyme,
J'appliquai Longuement de la main sur l'endroit de plus en plus
quatre jours après j'indiquai de l'écou de Scrotum Sur la
partie latérale, étant parvenu au foyer de l'amaigrir, il en
Sortit huit onces et plus d'un peu de sang de la veine.
J'eus l'ouverture faite et bas à fin de terminer la maladie
à l'écou. J'examinai le bled, sans autre examen, avec un
Charpy de l'Empêtre de l'écouillage par des poudres, et un fongus par
l'usage de l'eau Régénératrice. Le soir même de
l'opération les douleurs se dissipèrent; Le lendemain



19

Il est certain que la suppression de L'Eloute-mum-
vium a été la cause première de tous les désordres, rien
de si funeste que de voir l'inflammation de la prostate,
la dureté et le gonflement des testicules suivre l'usage de
ce remède administré imprudemment, quel que soit
même le résultat des accidents plus graves à qui se
mandent les secours les plus prompts. M. Guersnaz

Nous voyons un exemple frappant dans son traité de
La suppuration. J'en pourrais citer un d'un cavalier qui
vint en 1754. à l'hôpital de Dusseldorf, lequel avait une
chancrèze. Le médecin du Régiment lui avait donné des
remèdes pour le traiter, et vingt quatre heures l'avait tombé
en gangrène. Je fus dans la nécessité d'en faire l'amputation.
On trouve dans le Bulletin un grand nombre d'observations
de tumeurs aux testicules qui sont devenues très dangereuses
par l'application indue des Topiques. M. Hedra en cite un
exemple dans ses observations de chirurgie, les accidents ne
diffèrent que par la grande quantité de saignée qui furent
faites au malade, et la terminaison sifit par résolution.
L'observation LXXII. Du même auteur approche plus de celle
dont j'ai vu de donner le détail, mais l'auteur n'a pu être
comme. Ambroise Bertrandi cite une observation à peu près
pareille à celle dont j'ai fait mention, la terminaison a été
la même, le traitement a été un peu différent. J'aurais pu
en donner de fastidieux, car j'en ai persuadé que l'inflammation
et la fonte Suppuratoire qui en est résultée, sont souvent très
propres à accélérer la guérison. Des tumeurs indolentes et testiculaires
ou comme jeunissin survi du trois quarts, l'inflammation et la
douleur vite qui ont suivi la ponction, ont peut-être
été occasionnés par la piquure et l'instrument propre du testicule
de un instrument, lequel peut arriver dans un point le plus
malgré les précautions les plus exactes, et cette inflammation
s'en forme l'abus qui a dévié la guérison du malade.

Bourguin Chirurgien Major de l'armée de Corse, de l'hôpital
militaire de St Omer, Correspondant de l'Académie Royale de
Chirurgie.

Paris le 10 fev. 1770.



[Faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and orientation.]

